استخدام منتجات استهلاكية تتسرّب منها مادة بيسفينول A خطر على الناس عامة وعلى النساء الحوامل خاصة...

Parent Bisphenol A Accumulation In The Human Maternal-Feta-Placental Unit
G. oenfeld et. al./ Environmenatl Health Perspective vol. 110:A703-A707.Nov 2002

ملخّص المقالة:
في البحث الذي نشر عام 2002 كشفت مجموعة باحثين من برلين أنّه يمكن في الحقيقة تتبع كميات مهمة من مادة البيسفينول بدم النساء الحوامل، في المشيمة والحبل السرّي. المستويات التي تمّ قياسها كانت صغيرة نسبياً ولكنها لاءمت التركيزات التي استخدمها الباحثون في الأبحاث الأخيرة التي عالجت تأثير مادة بيسفينول A على تطور غدة البروستات عند الذكور والخطر المتفاقم لسرطان الثدي عند الإناث. أدرك الباحثون أن الأجنّة الذكورية تتأثر أكثر نتيجة لتعرّض الأم لمادة البيسفينول A من الأجنة الأنثوية، وأنّ هناك اختلافًا بين تركيزات مختلفة في دم نساء مختلفات، نتيجة لاستخدام منتجات استهلاكية تتسرّب منها مادة البيسفينول A بصورة مختلفة في كل بيت. في هذا البحث تمّ فحص نساء حوامل في جيل متوسّط (33 سنة) وكانت مدّة الحمل في المعدّل 39 أسبوعاً.
لقد كانت نتائج البحث مثيرة للقلق مرّة أخرى بشأن مدى التأثير الذي قد تسبّبه مادة البيسفينول A الموجودة في المحيط الذي يتواجد الناس فيه عمومًا، والنساء الحوامل خصوصًا.

للحصول على المقالة الكاملة باللغة الإنجليزية، يمكن التوجّه إلى مركز خدمات الزبائن...